

Схема лечебно профилактических мероприятий при выращивании индеек сверх тяжелых кроссов.

День роста	Мероприятия
1-3 дня	Аскорбиновая кислота (Витамин С) 2гр на 10 л воды
3-5 день	Байкокс, Интракокс (по инструкции)
5-8 день	Витамин Д3+Мультивитамины (по инструкции)
11-13 день	Сульфат меди (медный купорос) 5 гр. на 10л воды
14 сутки	Вакцинация против болезни Ньюкасла
16-21 сутки	Антибиотик широкого спектра действия минимум 3 дня, но не более 7 дней
28 сутки	Вакцинация против болезни Ньюкасла
30-33 сутки	Сульфат меди
35-37 сутки	Витамин Д3+Мультивитамины (по инструкции)
40-45 сутки	Профилактика микоплазмоза (тилан)
50-55 сутки	Аскорбиновая кислота

Проводить посадку птицы только в помещение, которое прогрето, где проведена предварительная дезинфекция, с влажностью воздуха не менее 60%.

Для профилактики кокцидиоза в кормах с первых суток до 70 дней должен присутствовать кокцидиостатик (ампроллиум, аватек, монензин) см. инструкцию.

Байкокс или Интракокс выпаивать только при признаках кокцидиоза или отсутствия кокцидиостатиков в кормах!!!

Для профилактики заболеваний респираторной системы (микоплазмоз, ринотрахеит индеек, орнитобактериоз, аспергиллез), а так же санации помещений проводить аэрозольную обработку с помощью ранцевых распылителей в помещении, где содержится птица дез. растворами такими как «Вироцид» 0,5 раствор, «Делеголь» 1% раствор, при отсутствии таких проводить возгонку однохлористого йода (согласно инструкции) 1-3 раза в неделю.

В жаркий период года в воду добавлять увеличенное количество аскорбиновой кислоты до 7 гр. на 10 литров воды.