

Программа инкубации яиц Мускусной утки при одновременной загрузке

Дата закладки:

неделя неделя

Инкубатор:

www.steel-dom.ru

| День цикла | Дата | День недели | Фаза | T° | Температура | Влажность | Вентиляция | Охлаждение и орошение |
|------------|------|-------------|------|----|--|------------------------|---|-----------------------|
| 0 | | | | | 99,5 F° (37,5 C°) | 92F° (33,5 C° 75% HR) | Заслонки закрыты | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | 99,3 F° (37,4 C°) | 91,5F° (33 C° 73% HR) | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | 99,1 F° (37,3C°) | 89,5 F° (32 C° 68% HR) | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | 99,0 F° (37,2 C°) | 87,8 F° (31 C° 62% HR) | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | 98,8 F° (37,1 C°) | 87F° (30,5 C° 60% HR) | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | 98,6 F° (37 C°) | 87F° (29,5 C° 55% HR) | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | | | | | 98,3F° (36,8 C°) | 90 F° (32 C° 67% HR) | Сначала прополоть вход воздуха и затянуть выход | |
| 33 | | | | | 98,3 F° | 92 F° (33,5 C° 75% HR) | | |
| 34 | | | | | 95 F° (35 C° 85% HR) Вечером | | | |
| 35 | | | | | 98F° синхронно зависимость от качества яиц | 93F° (34 C° 80% HR) | Открыть + на выходе и + на выходе воздуха, чтобы просушить яйца | (ртп) |

Экзотермическая фаза

Эндотермическая фаза

По возможности использовать контактный термометр для измерения температуры скорлупы. Температура должна быть между 99,5 и 100 F° (37,5-37,78)

Необходимо адаптировать в зависимости от типа инкубатора. Необходимо открывать в зависимости от потребностей в охлаждении и обогреве. При экзотермической фазе открытие заслонок входа воздуха должно прогрессивно увеличиваться до 50% и до максимального уровня на 25ый день. Выход воздуха увеличивается параллельно, сохраняя уровень меньший, чем вход воздуха. Необходимо стараться сохранять гидрометрию, несмотря на высокую открытость заслонок.

Необходимо адаптировать в зависимости от типа инкубатора. Необходимо открывать в зависимости от потребностей в охлаждении и обогреве. В течение эндотермической фазы, открытие заслонок входа воздуха должно быть умеренным, а выхода воздуха - наполовину закрыто.

Не должно быть ни охлаждения, ни орошения.

Вытаскиваем тележки из инкубатора. 10 мин спустя, орошаем яйца водой температурой 35 C°, затем ждем еще 15 - 20 мин. Общее время операции - около 30 мин. Температура в помещении должна быть 22 - 24 C°

Машина вывод

Вывод

Комментарии: Указанные в таблице критерии - рекомендуемые. Реальные показатели должны быть приближены максимально к ним.

Рекомендуется взвесить 5 - 6 потков при загрузке и проводить контроль из веса каждую неделю в один и тот же день недели вплоть до перевода. Цель: потеря яйцом веса до 12% от загрузки до перевода.