

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по применению средства для обработки сосков и вымени коров перед доением**  
**МАСТИКЛИН СТАРТ**

(Организация-производитель: ООО Фирма «БиоХимФарм», Владимирская обл., г. Радужный,  
организация - разработчик: ООО «Интеллектуальное животноводство», Россия, г. Москва)

**I. Общие сведения**

1. Мاستиклин старт – гигиеническое средство с дезинфицирующим эффектом предназначено для гигиенической обработки вымени коров перед доением. Может использоваться для общей гигиены вымени в период сухостоя, обработки вымени при проведении ветеринарных мероприятий, обработки (замачивания, стирки) многоразовых салфеток, пропитки одноразовых салфеток, обработки (мытья, протирки) рук оператора до и после доения.

2. Мاستиклин старт в качестве действующих веществ содержит хлоргексидин, изопропанол. Вспомогательные компоненты: 1,8-цинеол, композитный растворитель, смягчители, ПАВ, вода.

3. По внешнему виду средство представляет собой гомогенный прозрачный слегка маслянистый раствор от белого до светло-бежевого цвета. Смешивается с водой в любых соотношениях.

4. Средство выпускают расфасованным в 1, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 1000 л полимерных бутылках, канистрах и емкостях с герметично закрывающимися крышками.

5. Каждую канистру (ёмкость) маркируют с указанием: организации-производителя, её адреса и товарного знака, названия, объёма средства номера партии, даты изготовления (месяц, год), срока годности, информации о подтверждении соответствия, обозначения ТУ (СТО).

6. Мاستиклин старт хранят в плотно закрытой упаковке производителя, в вертикальном положении отдельно от лекарств, пищевых продуктов и кормов в при температуре от 0°С до + 30°С, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей. Транспортирование допускается любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на этом виде транспорта в условиях, гарантирующих сохранность средства и тары.

7. Срок годности в закрытой потребительской таре 2 года со дня изготовления.

**II. Моюще-дезинфицирующие свойства средства**

8. Мاستиклин старт обладает высокой моющей способностью, обусловленной наличием в его составе изопропанола (обеспечивающего эффективное растворение загрязнений) и ПАВ (обеспечивающего удаление загрязнений с обрабатываемых поверхностей).

9. Мاستиклин старт обладает широким спектром бактерицидного действия, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий вирусов, простейших и грибов, а также дрожжей, дерматофитов и липофильных вирусов. Очищает и дезинфицирует ткани, не вызывая их повреждения. Не абсорбируется в системный кровоток и не оказывает системного действия.

10. Мاستиклин старт оказывает смягчающее действие на соски вымени и улучшает его подготовку к дойке.

11. Мاستиклин старт по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу малоопасных веществ. При введении в брюшину средство относится к 5 классу практически нетоксичных веществ по классификации К.К. Сидорова. По степени ингаляционной опасности средство относится к 4 классу малоопасных веществ. Кожно-раздражающие, кожно-резорбтивные и сенсибилизирующие свойства в рекомендованных режимах применения у средства не выражены. Кумулятивный эффект отсутствует. Мاستиклин старт обладает умеренным раздражающим действием на слизистые оболочки глаза.

12. Средство не влияет на качество животноводческой продукции.

**III. Порядок применения**

Мастиклин старт готовый к применению раствор.

13. Применение Мاستиклин старт перед доением в виде спрея.

Средство пульверизатором равномерно распыляют на соски вымени. Через 20- 30 сек. соски сухими одноразовыми (предпочтительно) либо многоразовыми (после соответствующей подготовки) салфетками протирают соски. Расход средства 6-8 г. на одно животное.

14. Применение Мاستиклин старт перед доением в виде пены.

Средство с использованием специальных пеногенерирующих стаканов наносят в виде пены на соски вымени. Через 20- 30 сек. соски сухими одноразовыми (предпочтительно) либо многоразовыми (после соответствующей подготовки) салфетками протирают соски. Расход средства 3-4г. на одно животное.

15. Применение Мастиклин старт перед доением в виде моющего раствора (в случае сильного загрязнения вымени и сосков).

А) Средство пульверизатором равномерно распыляют на вымя и соски, так, чтобы они были обильно орошены. Через 30- 60 сек. смывают раствор струёй воды. Затем сухими одноразовыми (предпочтительно) либо многоразовыми (после соответствующей подготовки) салфетками высушивают вымя и соски. Далее выполняют операции по п. 13, либо 14. Расход средства 50-60 г. на одно животное.

Б) Обмывают вымя и соски струёй воды. Средство пульверизатором равномерно распыляют на вымя и соски, так, чтобы они были обильно орошены. Через 30- 60 сек. смывают раствор струёй воды. Затем сухими одноразовыми (предпочтительно) либо многоразовыми (после соответствующей подготовки) салфетками высушивают вымя и соски. Далее выполняют операции по п. 13, либо 14. Расход средства 30-40 г. на одно животное.

В) Обмывают вымя и соски струёй воды. Сухими одноразовыми (предпочтительно) либо многоразовыми (после соответствующей подготовки) салфетками высушивают вымя и соски. Выполняют операции по п. 13, либо 14. Расход средства 3-8г. на одно животное.

Г) Салфетками, смоченными в Мастиклин старт (без отжима) наносят средство на вымя и соски. Через 30- 60 сек. сухими одноразовыми (предпочтительно) либо многоразовыми (после соответствующей подготовки) салфетками вытирают и высушивают вымя и соски. Далее выполняют операции по п. 13, либо 14. Расход средства 50-100 г. на одно животное.

16. Применение Мастиклин старт для замачивания салфеток.

Салфетки замачивают в посуде, таре обеспечивающей полное погружение их в раствор Мастиклин старт. Время экспозиции не менее 2 часов.

Далее салфетки могут использоваться как с отжимом (в соответствии с инструкцией по применению салфеток Мастиклин напкин), так и без отжима (в соответствии с п. 15 Г настоящей инструкции).

17. Применение Мастиклин старт для общей гигиены вымени.

При проведении общегигиенических мероприятий вымени (в период сухостоя, при проведении ветеринарных мероприятий) Мастиклин старт применяют в соответствии с п.п. 13-15 настоящей инструкции в зависимости от степени загрязнённости вымени и сосков.

18. Применение Мастиклин старт для обработки рук оператора.

А) Для мытья рук Мастиклин старт разбавляют водой в соотношении 1:10 и используют раствор в качестве жидкого мыла.

Б) Для протирки рук Мастиклин старт разбавляют водой в соотношении 1:2. Время экспозиции для эффективной антисептической обработки, дезодорирования и очистки 5 мин.

#### **IV. Меры предосторожности**

19. Мастиклин старт и рабочие растворы используется только для наружного применения.

20. Не допускается использовать Мастиклин старт по истечении срока годности.

21. При случайном попадании средства в глаза их следует промыть питьевой водой.

22. При случайном попадании средства в желудок принять адсорбенты: активированный уголь (10-12 измельченных таблеток) или жженую магнезию (1-2 столовые ложки на стакан воды). Обратиться к врачу.

23. Запрещается применение использованной тары из-под средства для хранения и транспортировки пищевых продуктов.

24. Не допускать контакта с открытым пламенем, включенными нагревательными приборами. Не курить.

Для ветеринарного применения. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

ТУ 9318-236-89767728-2014

Производитель: ООО Фирма «БиоХимФарм»

т/ф: +7 (49254)32-795 e-mail: biohimfarm@mail.ru www.biohimfarm.ru

Разработчик: ООО «Интеллектуальное животноводство»

т/ф: +7 (499) 261-06-62 e-mail: ifarming@ya.ru www.ifarming.ru